

## **MORS-L**

Contient 30% de molécules organiques, de l'azote et des oligo-éléments

### Identification du produit

Nom commercial ..... **MORS-L**  
 Type de produit ..... **Engrais CE.**

### Composition (p/p%)

Matière organique ..... 30.00%  
 Azote total (N) ..... 10.00%  
 Manganèse (Mn) ..... 0,01%  
 Zinc (Zn) ..... 0,10%  
 Cuivre (Cu) ..... 0,01%  
 Magnésium (Mgo) ..... 1,00%

### Propriétés

**MORS-L** contient 30% de molécules organiques d'origine naturelle, de l'azote et des oligo-éléments.  
 L'emploi systématique de ce produit améliore les propriétés physico chimiques du sol et assure un développement végétal optimal des plantes.

### Doses d'application

Culture	Doses		Période d'application	
	foliaire	goutte à goutte	foliaire	goutte à goutte
<b>Légumes (Tomate, Piments, aubergine, Concombre, laitue, chou ...)</b>	200-250 cc/100 L d'eau	10-20 L/Ha	Faire une première application deux semaines après la plantation. l'entretien jusqu'à 10 jours avant la récolte	Faire une première application deux semaines après la plantation, avec un intervalle de 10 jours.
<b>Agrumes</b>	200-250 cc/100 L	10-20 L/Ha	Appliquer au début de la nouaison jusqu'à la période	Après formation des jeunes pousses, , avec un intervalle

	d'eau		de maturité des fruits	de 20-25 jours jusqu'à 1 mois avant la récolte.
<b>Coton</b>	200-250 cc/100 L d'eau	15-20 L/Ha	Appliquer pendant la période de floraison et le cocon	
<b>Arbres fruitiers (pomme, poire, cerise, pêche, grenade)</b>	250 cc/100 L d'eau	15 L/Ha	Appliquer au début de la formation des feuilles jusqu'à la récolte	Appliquer au période de plantation jusqu'à la récolte
<b>Cultures plein champ</b>	200-250 cc/100 L d'eau	15-20 L/Ha	Application foliaire 2 fois avec des herbicides de mauvaises herbes	Appliquer avec l'eau d'irrigation
<b>Fleurs</b>	125-175 cc/100 L d'eau	15-20 L/Ha	Appliquer au début de la culture jusqu'à la récolte	Applique avec un intervalle de 20-25 jours pendant la période de maturation
<b>Gazon</b>	-	15-20 L/Ha	-	Appliquer 2 fois pendant la période de maturation
<b>Vignoble</b>	200-250 cc/100 L d'eau	15-25 L/Ha	Appliquer au début de la formation des feuilles jusqu'à la fin de la période immature	Appliquer au début de la formation de la feuille. Maintenir jusqu'à la fin de la récolte
<b>Banane</b>	-	15-25 L/Ha	-	Appliquer au période de formation de fruits

## Consignes de sécurité

Conserver hors de portée des enfants

Ne pas manger et boire pendant l'application

Ne pas respirer la vapeur du produit

Tenir à l'écart de produits alimentaires, de boissons ainsi qu'aux aliments pour animaux

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste

Porter des gants de protection et un appareil de protection des yeux/du visage.

En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (lui montrer l'étiquette si possible)