

امينو كروب

تعريف المنتج

الاسم التجاري.....امينو كروب
نوع المنتجسماد

المكونات (ث / ث / %)

مجموع المواد العضوية 75.00%
الأحماض الأمينية الحرة 30.00%
مجموع النيتروجين 15.00%

خصائص

أمينو كروب منتج طبيعي وعضوية . يحتوي على 17 نوع من الأحماض الأمينية الحرة لتحفيز النمو المتوازن لجميع انواع المحاصيل.

الجرعات والتطبيقات

المقادير	وقت التطبيق	المحاصيل
0.5-1	المرحلة 3 إلى 5 أوراق و بعد 3 أسابيع	السكر البنجر، عباد الشمس، السلطات، البقدونس
0.5-0.6-0.7	المرحلة 3 إلى 5 أوراق، النمو الخضري، الازهار	القطن، فراولة، هوبلون
0.5-0.7	النباتات ذات 30 سم في الارتفاع،	الذرة
0.5-0.6-0.7	المرحلة 3 إلى 5 أوراق، الازهار في وقت مبكر، بعد: كل 4 أسابيع	التبغ، الطماطم،
0.5-0.7	قبل الازهار، بعد 3 أسابيع.	البطاطا، النباتات، فول الصويا، كانولا، شجرة الفاكهة، ب، حجر
0.5	المرحلة 3 إلى 5 أوراق، مع مبيدات الأعشاب	حبوب
0.5-0.6-0.7	المرحلة 3 إلى 5 أوراق، فترة الازهار، تشكل الفاكهة	البطيخ، ، الخيار
0.5,-0.6	الازهار، نضج الفواكه، بعد كل 3 أسابيع	الحمضيات، التفاح - الكمثرى، القرنبيط، البروكلي
0.5	براعم 30 سم، قبل و بعد الازهار ،	عنب الطاولة، الأرضي شوكي

0.5-0.6	براعم 10 سم، قبل 3 أسابيع من الحصاد	شجر الزيتون
0.5-0.6	بدء النمو، بعد 3 أسابيع	شجرة الموز
0.5-0.6-0.7	المرحلة 3 إلى 5 أوراق، فترة الازهار، والاثمار، بعد: كل 3 أسابيع	الباذنجان، الفلفل الحار
0.4-0.5	2-3 أسابيع بعد الإنبات، كل 2 أسابيع	بصل، جزر نبات، فجل
0.4-0.5-0.6	أوائل أيار / مايو، منتصف تموز / يوليه، منتصف أيلول / سبتمبر	عشب
المشاتل		
	ورقي	التطبيقات
التسميد		
200g / 100lt من الماء	600جم / هكتار	التطبيق الأول
200g / 100lt من الماء	600-800جم / ها	التطبيق الثاني
200g / 100lt من الماء	600جم / هكتار	بعد

تعليمات السلامة

يجب ان يبقى المنتج بعيدا عن متناول الأطفال
لا يجب الاكل او الشرب أثناء تطبيق المنتج
لا يجب تنفس بخار المنتج
يجب ابقاء المنتج بعيدا عن الطعام والمشروبات والأعلاف
في حالة ملامسة العينين، يجب الشطف فورا بالماء وطلب الاستشارة الطبية
ارتداء القفازات الواقية وحماية العين / الوجه
(في حالة وقوع حادث أو الشعور بالتوعك يجب طلب الاستشارة الطبية فورا (إظهار الملصق حيثما أمكن