



Prouduit	Voie d'Application	Doses		Période d'Application	Nombre d'Applications
		Par Application	Total		
BIOSTIMULANT					
RIZOTOP	Sol	5 L/Ha	15 L/Ha	Transplantation; croissance végétative; développement des fruits ; racines endommagées par nématodes ou herbicides.	3 applications
AMINOVITAL	Sol	12 - 15 L/Ha		Octobre - novembre jusqu'au mars-avril	pendant tout le cycle
AMINOCROP	Foliaire	0,5 - 0,6 - 0,6 Kg/Ha	1,5-1,8-1,8 Kg/Ha	1er app. : Début Croissance -2eme app. : 3 semaines après-3eme app. :3 semaines après	3 applications 2 applications
ACTIVE-K	Foliaire ou Sol	300-500 g/100 L d'eau ou 20-30 Kg/Ha	6-12 L/ Ha	à partir de la récolte.	2 – 3 applications, 10-15 jours d'intervalle
CORRECTEURS DES CARENCES					
CARE Ca	Foliaire ou Sol	200-300 cc/100 L d'eau ou 10 L/Ha	30 L/Ha	Nouaison jusqu'à la récolte	tous les 15-20 jours
MAGIC SA	Foliaire	50-70-100 g/arbre	150 - 210 - 300 g/arbre	Appliquer au début et au milieu de la production Appliquer lorsque la production est à pleine capacité	3 applications
AMENDEMENTS ORGANIQUES					
MORS-L	Sol	15-25 L/Ha	30-50 L/Ha	Appliquer au période de formation de fruits	2 – 3 applications
ALL-WIN	Sol	50 – 60 L/Ha	100 – 120 L/Ha	Période de Croissance	2 – 3 applications
SULPHOMIN	Sol	20 L/Ha	60 L/Ha	chaque 1-2 semaines	3 – 4 applications
CARE MOL	Sol	5 – 7 L/1000 m2)	15 – 21 L/1000 m2	Période de Croissance	2 – 3 applications