



| Produit | Voie d'Application | Doses | | Période d'Application | Nombre d'Applications |
|---------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|--|-----------------------|
| | | Par Application | Total | | |
| BIOSTIMULANT | | | | | |
| AMINOVITAL | Sol | 6 L/Ha | 18 L/Ha | pendant tout le cycle (Surout periodes de froid et accompagné) | 3 applications |
| POWER VITAL | Foliaire | 0,2 - 0,3 % | 0,4-0,6% | Stade 4-6 feuilles et 14 – 21 jours après | 2 applications |
| AMINOCROP | Foliaire | 0,5 - 1 Kg/Ha | 1-2 Kg/Ha | Première Application : Stade 3 à 5 Feuilles Deuxième Application : 3 Semaines Après | 2 applications |
| ACTIVE-K | Foliaire | 300-500 g/100 L d'eau | 900-15000 g/100 L d'eau | période de tuberculose (après que les plantes atteignent 10-15 cm) | 2-3 applications |
| CORRECTEURS DES CARENCES | | | | | |
| CARE B | Foliaire | 300 cc/100 L | 900 cc/100 L | Masse foliaire suffisante | 2 à 3 applications |
| FULL ZNP | Foliaire | 2-2,5 L/ Ha | 4-5 L / Ha | Avant et après la période de tallage | 2 applications |
| ETHYMOL | Foliaire | 200 g/100 L d'eau | 600 g/100 d'eau | Formation des tubercules | 2 à 3 applications |
| AMENDEMENTS ORGANIQUES | | | | | |
| SULPHOMIN | Sol | 15– 20 L/Ha | 45– 60 L/ Ha | chaque 1-2 semaines | 2 à 3 applications |