



Produit	Voie d'Aplicacion	Dosis		Momento de Aplicacion	Numero de Aplicaciones
		Por Aplicacion	Total		
<b>BIOSTIMULANTES</b>					
RIZOTOP	Sol	2 - 3 L/Ha	4 - 6 L/Ha	Deux premières irrigations	1 - 2 applications
AMINOVITAL	Foliaire	0,2 - 0,3 %	4 - 6 L/Ha	Printemps combiné avec les phytosanitaires	2 - 3 applications
AMINOCROP	Sol	0,4 - 0,5 Kg/Ha	1,2 - 1,5 Kg/Ha	1er application : 2-3 semaines après germination Après : Chaque 2 semaines	2 - 3 applications
ACTIVE-K	Foliaire	300 - 500 g/100 L d'eau	600 - 1000 L d'eau	période de tuberculose (après que les plantes atteignent 10-15 cm)	2 - 3 applications
ALGACARE-L	Foliaire ou Sol	200 - 250 cc /100L ou 2 - 4 L /Ha	8 - 16 L/Ha	depuis la transplantation et tous les 10 - 15 jours.	3 - 4 applications
<b>CORRECTEURS DES CARENCES</b>					
CARE SALT	Sol	10 L/Ha	30 L/Ha	Pendant tout le cycle	3 applications
CARE MOL	Sol	5 - 10 L/Ha	40 - 60 L/Ha	Pendant tout le cycle	mensuel
CARE Zn	Foliaire	200 - 300 cc/100 L	6 - 8 L / Ha	Pendant tout le cycle	3 applications
CARE B	Foliaire	200 - 300 cc/100 L	6 - 9 L/Ha	Durant la formation du carotte	3 applications
CARE MZ	Foliaire	200 - 300 cc/100 L	6 - 9 L/Ha	Pendant tout le cycle	3 applications
CARE K	Foliaire	300 - 400 cc/100 L	12 - 15 L/Ha	Durant la formation du carotte	3 - 4 aplicaciones
CARE Ca	Foliaire	300 - 400 cc/100 L	12 - 15 L/Ha	Durant la formation du carotte	3 - 4 aplicaciones
MOBORCIN	Foliaire	50 - 75 g/100 L d'eau	100 - 150 g/100 L d'eau	Avant la germination et après la nouaison	2 applications
K-JET	Foliaire	150 - 200 g/100 L d'eau	300 - 600 g/100 L d'eau	Nouaison	2 applications
ETHYMOL	Foliaire	200 g/100 L d'eau	400 g/100 L d'eau	Formation des fruits	2 applications
<b>AMENDEMENTS ORGANIQUES</b>					
MORS-L	Foliaire ou Sol	200 - 250 cc/100 L d'eau ou 10 - 20 L/Ha	40 - 80 L/Ha	Faire une première application deux semaines après la plantation, avec un intervalle de 10 jours	3 - 4 Applications
ALL-WIN	Foliaire	2 - 3 L/Ha	8 - 6 L/Ha	Préfloraison, intervalle de 2 – 3 Semaines.	3 - 4 Applications
SULPHOMIN	Foliaire ou Sol	15 - 20 L/Ha	45 - 60 L/Ha	chaque 4 semaine	3 - 4 aplicaciones
<b>BIBOTANIKUES</b>					
PROSOIL	Sol	3 - 4 L/Ha	12 - 16 L/Ha	Transplantation	3 - 4 aplicaciones
<b>PROTECTION ET AUTODEFENSE DES PLANTES</b>					
PROCARE Cu	Foliaire ou Sol	200 cc/hl ou 0,8 - 1,2 L/Ha	400 cc/hl	Appliquer entre 4 et 5 semaines après la transplantation ou dès l'apparition des premiers symptômes de déficience. Répéter au 7-10 jours si nécessaire.	4 applications
PROCARE 42	Foliaire	300 - 400 cc / 100 L	6 - 9 L/ha	Pendant tout le cycle	2 - 3 applications