



Produit	Voie d'Application	Doses		Période d'Application	Nombre d'Applications
		Par Application	Total		
BIOSTIMULANTS					
RIZOTOP	Sol	2 - 3 L/Ha	4 - 6 L/Ha	Transplantation; croissance végétative ; développement des fruits	3-4 applications
MAXIBLOOM	Foliaire ou Sol	0.7-1 cc/Lt ou 1-2 Lt/Ha	3-6 Lt/Ha	Tous les 15-20 jours, masse foliaire suffisante	2-3 applications
FRUTOP	Foliaire ou Sol	200-300 cc/100 L ou 6-8 l/ha	18-24 l/ha	Préfloraison, nouaison et grossissement	3 applications
POWER VITAL	Foliaire	0,2 - 0,3 % ou 2-3 L/Ha	6-9 L/Ha	stade 4-5 feuilles, préfloraison et 10 – 14 jours après floraison	3 applications
AMINOCROP	Foliaire	0,5-0,6-0,7Kg/Ha	1.5-1.8-2,1 Kg/Ha	Stade 3 à 5 Feuilles - Période de floraison - Grossissement des fruits	3 applications
ACTIVE-K	Foliaire ou Sol	300-400 g/100 L d'eau ou 10-20 Kg/Ha	30-60 kg/ Ha	à partir de la nouaison jusqu'à la récolte	2-3 applications avec 10-15 jours d'intervalle
CORRECTEURS DES CARENCES					
CARE Ca	Foliaire	300 cc/100 L	900 cc/100 L	Nouaison jusqu'à la récolte	Tous les 15-20 jours
CARE COMBI	Foliaire	100-200 grs/100 L d'eau	300-600 g/100 L d'eau	pendant tout le cycle	2-3 applications
KING COMBI	Foliaire	4 kg/ ha	12 Kg / Ha	durant tout le cycle	3 applications
BIOMIXT	Foliaire ou Sol	150 - 250 g/100 L d'eau ou 2,5 – 5 Kg/Ha	10 – 20 Kg/Ha	utilisé durant tout le cycle de la culture surtout pendant les moments de grand besoins et des l'apparition des premiers symptômes	2 à 4 applications avec un intervalle de 7 – 15 jours.
AMENDEMENTS ORGANIQUES					
MORS-L	Foliaire ou Sol	200-250 cc/100 L d'eau ou 10-20 L/Ha	40-80 L/Ha	Faire une première application deux semaines après la plantation, l'entretien jusqu'à 10 jours avant la récolte	3-4 Applications
ALL-WIN	Foliaire	2 – 3 L/Ha L/Ha	6 – 9 L/Ha L/Ha	Préfloraison, avec un intervalle de 2 – 3 Semaines.	2-3 Applications
SULPHOMIN	Foliaire ou Sol	15– 20 lt / Ha	45– 60 lt / Ha	chaque 2-4 semaines	3-4 Applications
CARE MOL	Sol	2 – 4 lt/1000 m2	6– 12 lt/1000 m2	Préfloraison, avec un intervalle de 2 – 3 Semaines.	2-3 Applications
PROTECTION ET AUTODEFENSE DES PLANTES					
FOSFI ZN	Foliaire	100-200 (cc /100l)	400-800 (cc /100l)	pendant tout le cycle de culture.	Au moins 3 ou 4 applications avec un intervalle de 15 à 20 jours