



Produit	Voie d'Application	Doses		Période d'Application	Nombre d'Applications
		Par Application	Total		
BIOSTIMULANTS					
AMINOVITAL	Foliaire ou Sol	0,1-0,2 % ou 4-6 L/Ha	16-24 L/Ha	Transplantation-Etapes primaires Traitements après la transplantation	3 - 4 application en Moyenne
POWER VITAL	Foliaire	0,2 - 0,3 % ou 2-3 L/Ha	8-12 L/Ha	Depuis la transplantation applique chaque 10 – 14 jours	4 applications
ALGACARE-L	Foliaire	200-300cc /100L	800-1200cc /100L	Depuis la transplantation et tous les 10 - 15 jours	3 – 4 applications
CORRECTEURS DES CARENCES					
MAGIC SA	Foliaire ou sol	3 – 5 g /100 Litres d'eau	12 – 20 g/100 L d'eau	Durant tout le cycle de la plante	3 – 4 applications
BIOMIXT	Foliaire ou Sol	150 - 250 g/100 L d'eau ou 2,5 – 5 Kg/Ha	10 – 20 Kg/Ha	utilisé durant tout le cycle de la culture surtout pendant les moments de grand besoins et des l'apparition des premiers symptômes	2 à 4 applications avec un intervalle de 7 – 15 jours.
AMENDEMENTS ORGANIQUES					
MORS-L	Foliaire ou Sol	125-175 cc/100 L d'eau ou 15-20 L/Ha	45-60 L/Ha	Appliquer au début de la culture jusqu'à la récolte Applique avec un intervalle de 20-25 jours pendant la période de maturation	3 – 4 applications
ALL-WIN	Sol	20 – 40 L/Ha	80 – 160 L/Ha	Préfloraison, avec un intervalle de 2 – 3 Semaines.	2 à 4 applications
SULPHOMIN	Sol	20 lt /Ha	80 lt /Ha	chaque 1-2 semaines	3 – 4 applications
CARE MOL	Sol	4 L / Ha	16 L / Ha	Préfloraison, avec un intervalle de 2 – 3 Semaines.	2 à 4 applications
BIOBOTANQUES					
PROSOIL	Sol	60-80 cc/ 100 m ²	180-240 cc/ 100 m ²	durant tout le cycle de la plante	3 – 4 applications
PROTECTION ET AUTODEFENSE DES PLANTES					
PROCARE 42	Foliaire	150 - 200 cc/100 L	450 - 600 cc/100 L	chaque 1-2 semaines	2 à 4 applications
PROCARE 32	Foliaire	150 - 200 cc/100 L	450 - 600 cc/100 L	chaque 1-2 semaines	2 à 4 applications