



Produit	Voie D'Application	Doses		Période d'Application	Nombre d'Applications
		Par Application	Totale		
BIOSTIMULANT					
RIZOTOP	Sol	2 - 3 L/Ha	4 - 6 L/Ha	Début de compagne et grossissement	1-2 applications
AMINOVITAL	Foliaire ou Sol	0,2-0,3 % ou 12-15 L/Ha	40-50 L/Ha	Cas de Stresse et besoin d'énergie en générale (Début floraison, chute pétales, grossissement..etc.)	3 - 4 application en Moyenne
MAXIBLOOM	Foliaire	0,75 - 1L / 1000 L d'eau	2 L/Ha	Entre préfloraison et grossissement	2-3 applications
FRUTOP	Foliaire ou Sol	0,2 - 0,3 % ou 2-3 L/Ha	6-9 L / Ha	Préfloraison, nouaison et grossissement	3 applications (très Recommandé)
POWER VITAL	Foliaire	0,2 - 0,3 % ou 2-3 L/Ha	8-12 L/Ha	stade rose du bourgeon, pleine floraison, début floraison et 21 jours après	4 applications
CITOGROW	Foliaire	20-25 cc/100 L d'eau	75-1000 cc /100 L d'eau	Après la floraison	2 applications
AMINOCROP	Sol	0,6-0,7Kg/Ha	1.2-1.4 Kg/Ha	Première Application : Période de Floraison- Deuxième Application: 3 semaines après	2 applications
ALGACARE-L	Foliaire ou Sol	150-300cc /100L ou 2-4 L /Ha	6-12 L/ Hectare	pré-floraison, la formation des fruits et la croissance	2 – 3 applications
CORRECTEURS DES CARENCES					
CARE Mg	Foliaire	300 cc / 100 L d'eau	6 - 8 L / Ha	A partir de la chute des pétales	Chaque 15 Jours: Intensité de carence
CARE Zn	Foliaire	200-300 cc/100L	6 - 8 L / Ha	A partir de la chute des pétales	Chaque 15 Jours: Intensité de carence
CARE B	Foliaire	200-300 cc/100L	400-600 cc/100L	Chutte des feuilles et préfloraison	2 applications
CARE MZ	Foliaire	200 - 300 cc/100 L	10 - 15 L/Ha	A partir de la chute des pétales	2 - 4 Applications, séparée de 12 jours
CARE K	Foliaire	300 - 400 cc/100L	4 - 5 L/Ha	Appliquez de la fosse durcissement jusqu'à la récolte	3-4 Applications
CARE Ca	Foliaire	300 cc/100 L	900 cc/100L	En période de véraison de fruit	2-3 Applications selon besoin.
CARE COMBI	Foliaire	3 L/Ha	12 L/Ha	pendant tout le cycle	Plusieurs passages sont recommandés
MAGIC SA	Foliaire	50-70-100 g/arbre	150-210-300 g/arbre	Appliquer au début et au milieu de la production-Appliquer lorsque la production est à pleine capacité	3 applications
CARE Mn	Foliaire ou Sol	0.4 - 0.8 % ou 4 - 8 L/ha	12-32 L/Ha	Aspects des premiers symptômes	2 à 3 applications
KING COMBI	Foliaire	3 kg/ ha	9 Kg / Ha	durant tout le cycle	3 applications
FULL ZNP	Foliaire	10 L/Ha	40 L/Ha	Avec chaque application de pesticide	3 - 4 Applications
MOBORCIN	Foliaire	50-75 g/100 L d'eau	100-150 g/100 Lt eau	Appliquer au début de la floraison et après la récolte	2 applications
K-JET	Foliaire	150-200 g/100 L d'eau	450-600 gr/100 L d'eau	Nouaison	2 - 3 Applications, séparée de 10 jours
BIOMIXT	Foliaire ou Sol	150 - 250 g/100 L d'eau ou 2,5 – 5 Kg/Ha	10 – 20 Kg/Ha	utilisé durant tout le cycle de la culture surtout pendant les moments de grand besoins et des l'apparition des premiers symptômes	2 à 4 applications avec un intervalle de 7 – 15 jours.
ETHYMOL	Foliaire	200 g/100 L d'eau	400gr/100lt eau	Formation des fruits et croissance	2 applications
AMENDEMENTS ORGANIQUES					
MORS-L	Foliaire ou Sol	250 cc/100 L d'eau ou 15 L/Ha	750 cc/100 L d'eau ou 45 L/Ha	Appliquer au début de la formation des feuilles jusqu'à la récolte ou Appliquer au période de plantation jusqu'à la récolte	3 - 4 Applications
ALL-WIN	Foliaire	20 - 25 L/Ha	40 - 50 L/Ha	chutte des pétales, Nouaison et Grossissent	2 - 3 Application
SULPHOMIN	Foliaire ou Sol	15– 20 lt / Ha	-	durant tout le cycle	chaque 3 – 4 semaine
CARE SALT	Sol	20 - 25 L/Ha	80 L/Ha	Au long du cycle de culture	4 applications
CARE MOL	Sol	15 - 20 L / Ha	40 - 60 L/ha	Pré-brotation, Postnouaison et véraison.	3 - 4 Applications
BIOBOTANIQUES					
PROSOIL	sol	10-15 cc/30-40 cc/70-80 cc	30-45 cc/90-120 cc/210-240 cc	Arbre jeune/Arbre de 5-6 ans/Arbre adulte	3 applications
PROTECTION ET AUTODEFENSES DES PLANTES					
PROCARE 42	sol	8-10L/Ha	16-20L/Ha	Postnouaison et 1 mois après la chute des pétales	1 application / moment d'application
	Foliaire	300 - 400 cc / 100 L	900 - 1200 cc / 100 L	Chutte des pétales, été - printemps.	1 application / moment d'application
PROCARE 32	sol	8-10L/Ha	16-20L/Ha	Postnouaison et 1 mois après la chute des pétales	1 application / moment d'application
	Foliaire	300 - 400 cc / 100 L	900 - 1200 cc / 100 L	Chutte des pétales, été - printemps.	1 application / moment d'application
PROCARE CU	Foliaire ou Sol	150 cc/Hi ou 1,5 – 2,5 (L / Ha)	6-10 L/Ha	Appliquer en préfloraison et avant le gonflement des bourgeons	3 - 4 Applications
FOSFI ZN	Foliaire	200 cc /100l	800 cc /100l	Appliquer en préfloraison, engraissement et les stades de maturation.	3- 4 Applications