



Produit	Voie d'Application	Doses		Période d'Application	Nombre d'Applications
		Par Application	Total		
<b>BIOSTIMULANTS</b>					
<b>RIZOTOP</b>	Sol	2 - 3 L/Ha	6 - 12 L/Ha	Transplantation; croissance végétative; développement des fruits ; racines endommagées par nématodes ou herbicides.	3-4 applications
<b>FRUTOP</b>	Foliaire ou Sol	200 - 300 cc/100 L ou 6 - 8 L/Ha	18 - 24 L / Ha	Pré-floraison, nouaison, grossissement	3 applications (très Recommandé)
<b>AMINOCROP</b>	Foliaire	0,5 - 0,7 - 0,7 - 0,6 Kg/Ha	2 - 2,8 - 2.8 - 2,4 Kg/Ha	1er app : Stade 3 à 5 Feuilles-2eme app:Période de Floraison- 3eme app: Fructification- Après: Chaque 3 semaines	4-6 applications 2 applications
<b>ACTIVE-K</b>	Foliaire ou Sol	200 - 300 g/100 L d'eau ou 10 - 20 Kg/Ha	6 - 12 L/ Hectare	à partir de la nouaison jusqu'à la période de maturation	2 - 3 applications, 7-10 jours d'intervalle
<b>CORRECTEURS DES CARENCES</b>					
<b>CARE Ca</b>	Foliaire ou Sol	200 - 300 cc/100 L d'eau ou 2 - 3 L/Ha	-	Nouaison jusqu'à la récolte	Tous les 15-20 jours
<b>CARE COMBI</b>	Foliaire	100 - 200 g/100 L d'eau	300 - 600 g/100 L d'eau	pendant tout le cycle de culture..	3 applications
<b>BIOMIXT</b>	Foliaire ou Sol	150 - 250 g/100 L d'eau ou 2,5 - 5 Kg/Ha	10 - 20 Kg/Ha	utilisé durant tout le cycle de la culture surtout pendant les moments de grand besoins et des l'apparition des premiers symptômes	2 à 4 applications avec un intervalle de 7 - 15 jours.
<b>AMENDEMENTS ORGANIQUES</b>					
<b>MORS-L</b>	Foliaire ou goutte à goutte	200 - 250 cc/100 L d'eau ou 10 - 20 L/Ha	40 - 80 L/Ha	Faire une première application deux semaines après la plantation, avec un intervalle de 10 jours.	3 - 4 applications
<b>ALL-WIN</b>	Foliaire	2 - 3 L/Ha	6 - 9 L/Ha	Préfloraison, avec un intervalle de 2 - 3 Semaines.	2 - 3 applications
<b>CARE MOL</b>	Sol	2 - 4 L/1000 m2	6 - 12 L/1000 m2	Préfloraison, avec un intervalle de 2 - 3 Semaines.	2 - 3 applications
<b>PROTECTION ET AUTODEFENSE DES PLANTES</b>					
<b>FOSFI ZN</b>	Foliaire	100 cc /100 L	400 cc /100 L	pendant tout le cycle de culture..	Au moins 3 ou 4 applications avec un intervalle de 15 à 20 jours