



Produit	Voie d'Application	Doses		Période d'Application	Nombre d'Applications
		Par Application	Total		
<b>BIOSTIMULANTS</b>					
RIZOTOP	Sol	3 L/Ha	6 - 8 L/Ha	Au moment de la plantation et répéter à 15 jours	2 - 3 applications
AMINOVITAL	Foliaire	0,4 % ou 1 - 2 L/Ha	4 - 5 L/Ha	Depuis des flambées de 10 cm de commencer à remplir les tubercules	4 applications / 7 jours
FRUTOP	Foliaire ou Sol	0,2 - 0,3 % ou 3 L/Ha	6 - 9 L / Ha	Pré-floraison, nouaison, grossissement	2 applications/ 7 jours
POWER VITAL POWER VITAL	Foliaire	0.2 - 0.3 % ou 2 - 3 L/Ha	8 - 12 L/Ha	Début plantation, Stade 3-5 feuilles, Tubercule à 15-20 mm et Début Floraison	4 applications
AMINOCROP	Sol	0,5 - 0,6 Kg/Ha	1 - 1,2 Kg/Ha	Première Application : Avant Floraison- Deuxième Application: 3 semaines Après	2 applications
ACTIVE-K	Foliaire	300 - 500 g/100 L d'eau	900 - 1500 g/100L d'eau	Période de tuberculose (après que les plantes atteignent 10-15 cm)	2 - 3 applications
<b>CORRECTEURS DES CARENCES</b>					
CARE Mg	Foliaire ou sol	0.3 - 0.5 % ou 2 - 5 L/Ha	6 - 15 L/Ha	7-10 jours après cas d'urgence	2 à 3 applications
CARE B	Foliaire	200 - 300 cc/100 L	100 - 150 cc/100L	Début de culture	2 Applications
CARE MZ	Foliaire ou sol	200-300 cc/100L	10 - 15 L/Ha	7 – 10 Jours après émergence.	2 applications séparées de 10 jours
CARE K	Foliaire	600 cc/100 L	1800 cc/100 L	pendant le remplissage du tubercule.	2 - 3 applications / 15 jours
CARE COMBI	Foliaire	100 g/100 L d'eau	300 g/100 L d'eau	pendant tout le cycle	3 applications
KING COMBI	Foliaire	3 kg/ Ha	9 Kg / Ha	durant tout le cycle	3 applications
FULL ZNP	Foliaire	2 - 2,5 L/Ha	6 - 7,5 L/Ha	Dans la première période, avant et après la période de tallage	3 applications
K-JET	Foliaire	150 - 200 g/100 L d'eau	300 - 400 g/100 L d'eau	Formation des tubercules	2 applications
ETHYMOL	Foliaire	200 g/100 L d'eau	400 g/100 L d'eau	Formation des tubercules	2 applications
BIOMIXT	Foliaire ou Sol	150 - 250 g/100 L d'eau ou 2,5 – 5 Kg/Ha	10 – 20 Kg/Ha	utilisé durant tout le cycle de la culture surtout pendant les moments de grand besoins et des l'apparition des premiers symptômes	2 à 4 applications avec un intervalle de 7 - 15 jours.
<b>AMENDEMENTS ORGANIQUES</b>					
ALL-WIN	Foliaire	3 – 5 L/1000 L d'eau.	9 – 15 L/1000 L d'eau	Périodes Végétatives	3 applications
SULPHOMIN	Foliaire ou sol	15 – 20 L/ Ha	45– 60 L/Ha	chaque 1-2 semaine	2 - 3 applications
CARE SALT	Sol			Sols de basse perméabilité : 40 - 80 L/Ha par application Sol déstructurés (fissurés) : 100 -160 L/Ha rapartits en 2 à 3 applications	
CARE MOL	Sol	5 L / Ha	10 L /Ha	15 jours depuis plantation	2 application / 15 jours
<b>PROTECTION ET AUTODEFENSE DES PLANTES</b>					
PROCARE Cu	Foliaire ou Sol	200 cc/hl ou 1,0 – 2,0 L/Ha	4-8 L/Ha	Appliquer 30 jours après la semence et répéter chaque 15 - 20 jours, ou avant si des symptômes de déficience de cuivre apparaissent	4 applications